

Návod na použitie

Milá pacientka, milý pacient!

Pozorne si prečítajte celý návod na použitie predtým, ako začnete užívať Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle

Čo obsahujú Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle?

1 tableta obsahuje 20 mg suchého výťažku z pľuzgierky islandskej (7:1).

Ďalšie zložky:

Sorbitol (E420), hypromelóza, aróma čiernych ríbezlí, kyselina askorbová (vitamín C), xantánová guma (E415), pantoténan vápenatý, bezvodá kyselina citrónová, polyetylén glykol 6000, stearan horečnatý (rastl.), cyklamát sodný, mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171), oxid železitý (III) (E172), sacharín sodný (E954).

Kedy sa užíva Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle?

Tablety na cmúľanie sa užívajú pri dráždení na kašeľ a pri zachrípnutí.

Látky obsiahnuté v islandskom lišajníku (*Cetraria islandica* - pľuzgierka isladská) vytvárajú ochrannú vrstvu na sliznici. Pri tom sa oslabujú vonkajšie dráždenia, ktoré sťažujú liečenie poškodenej sliznice, a podporuje sa telový obranný systém.

Vysoký podiel slizov vo výťažku z islandského lišajníka bráni vysušeniu sliznice viazaním vody na jej povrchu. Dodatočne sa v dôsledku cmúľania tabliet podporuje vylučovanie slín a tým sa zvlhčuje podráždená sliznica.

Kedy je potrebná opatrnosť pri užívaní Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle?

Pri správnom užívaní nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.

Pri alergii (precitlivenosti) na ktorúkoľvek z obsiahnutých zložiek sa Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle nesmú užívať.

Sorbitol obsiahnutý v Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle, môže mať vo väčšom množstve mierny laxatívny účinok. Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle nie sú vhodné pri neznášanlivosti fruktózy.

O užívaní Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle v tehotenstve a počas dojčenia nie sú dostatočné údaje. Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle sa preto majú užívať v tehotenstve a počas dojčenia iba po dohode s lekárom.

U detí sa užívanie tabliet na cmúľanie odporúča až od 4 rokov, aby sa zabránilo náhodnému prehltnutiu.

Ako sa Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle užívajú?

Cmúľať 1 tabletu až 10-krát denne.

Informácie pre diabetikov:

1 tableta obsahuje 0,5 g sorbitolu, čo zodpovedá 0,04 BE.

Ako dlho môžete užívať Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle?

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

Ktoré pokyny musíte dodržiavať ohľadne času použiteľnosti a uchovávaní?

Dátum expirácie (EXP) je uvedený na škatuľke a blistri. Nepoužívajte Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle po dátume expirácie.

Tablety na cmúľanie uchovávajú v suchu pri teplote do 25 °C.

V akých veľkostiach balenia sa Aspecton[®] tablety Čierne ríbezle predávajú?

Balenia s 30 a 60 tabletami.

Výrobca

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf, Nemecko

Telefón: 02243 / 87-0, Telefax: 02243 / 87-175

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v Máj 2014

Zdravotnícka pomôcka.

[Označenie CE]

Uchovávajú mimo dohľadu a dosahu detí.